

Gastroskopi

(Kikkertundersøgelse af spiserør og mavesækken)

Dato: _____ Tid: _____

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm med en bøjelig kikkert ført igennem mund/næse. Der kan tages vævsprøver igennem kikkerten.

Forberedelse:

Du skal være fastende i mindst 6 timer før undersøgelsen. Dog må man gerne drikke et lille glas vand 2 timer før, hvis man er meget tørstig. Nødvendig medicin kan tages om morgenen.

Undersøgelsen:

Efter at være blevet lokalbedøvet med spray i svælget eller lokalbedøvet med creme i næseboret føres skopet ned gennem spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Du kan på anmodning herom få injektion med et beroligende middel. Du må i givet fald sørge for hjemtransport ved pårørende, Falck eller taxa.

Undersøgelsen foregår liggende på venstre side. Kikkerten føres igennem næse/mund til spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Der er rigelig plads til at trække vejret.

Undersøgelsen er ikke forbundet med smerter, kun let ubehag fornemmes, når slangen synkes. Ligeledes kan luft spænding i maven forekomme. Undersøgelse varer 3-5 minutter.

Resultat:

Resultatet af undersøgelsen gives umiddelbart efter afslutning af undersøgelsen. Hvis der er givet beroligende medicin, må du ikke være i bil eller tage på arbejde samme dag. Hvis der er givet svælgbedøvelse, må du ikke spise eller drikke den 1. time efter undersøgelsen. Ellers kan man spise og drikke umiddelbart efter undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen fremsendes til din egen læge.