

## Sigmoideoskopi

(Kikkertundersøgelse af endetarmen og den nederste del af tyktarmen)

Dato: \_\_\_\_\_ Tid: \_\_\_\_\_

### Forberedelse:

**OBS !!** Hvis du har pacemaker eller får blodfortyndende medicin, skal det oplyses til læge ved undersøgelsen.

Fra kl. 17:00 aftenen før undersøgelsen må der kun indtages flydende kost som omfatter: Vand, klare supper, siede supper, æblejuice, kaffe, the, saftvand og sodavand.

Du må **IKKE** indtage mælkeprodukter.

### Undersøgelsesdagen:

Du må spise og drikke normalt efter Klyx indtaget 2 – 2½ time før undersøgelsen. Klyx trykkes op i tarmen 2 – 2,5 time før undersøgelsen ved at klemme på flasken til den er tom (kan dog ikke tømmes helt) – følg brugervejledningen på pakken.

### Undersøgelsen

Ved undersøgelsen ligger du på venstre side. Der kan ved undersøgelsen være ubehag fra luften, der pustes ind i tarmen samt lette smerter på grund af træk i tarmen. Selve undersøgelsen varer ca. 5 – 10 min.

Der kan uden smerter tages vævsprøver og fjernes evt. polypper.

### Efter undersøgelsen:

Resultatet på undersøgelsen får du med det samme.

Du kan tage på arbejde efter denne type undersøgelse.

### Resultat:

I nogle tilfælde vil der blive taget vævsprøver til nærmere mikroskopisk undersøgelse.

Svaret vil foreligge efter ca. 7 dage, og du vil blive kontaktet af klinikken, når svaret foreligger.

### Ved komplikationer:

Efter udtagning af vævsprøver kan der komme en lille smule blod i afføringen det første døgn.

I **særdeles sjældne** tilfælde kan der efter polypfjernelse opstå kraftig blødning eller hul på tarmen, som vil kræve indlæggelse på hospital. Skulle der opstå kraftig blødning, smerter eller feber, skal du straks kontakte klinikken, 1813 eller tage på nærmeste hospital/akutklinik (skadestue).

Resultatet af undersøgelsen fremsendes til din egen læge.