Gastroskopi

(Kikkertundersøgelse af spiserør og mavesækken)

Dato:_____ Tid:_____

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm med en bøjelig kikkert ført igennem næse/mund. Der kan tages vævsprøver igennem kikkerten.

Forberedelse:

Du skal være fastende i **mindst 6 timer før undersøgelsen**. Nødvendig medicin kan tages om morgenen samme med et lille glas vand, senest 2 timer før undersøgelsen.

Undersøgelsen:

Efter at være blevet lokalbedøvet med spray i svælget, eller lokalbedøvet med creme i næseboret, føres skopet ned gennem spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.
Du kan på anmodning herom få injektion med et beroligende middel. Du må i givet fald sørge for hjemtransport ved pårørende, Falck eller taxa.

Undersøgelsen foregår liggende på venstre side. Kikkerten føres igennem næse/mund til spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Der er rigelig plads til at trække vejret.

Undersøgelsen er ikke forbundet med smerter, det kan spænde og svie i næsen ved start af undersøgelsen, men du får lokalbedøvende gel i næsen, inden start. Ligeledes kan luft spænding i maven forekomme. Undersøgelse varer 3-5 minutter.

Resultat:

Resultatet af undersøgelsen gives umiddelbart efter afslutning af undersøgelsen. Hvis der er taget vævsprøver, er der typisk brevsvar efter 2 uger, medmindre andet er aftalt med lægen. Hvis der er givet svælgbedøvelse, må du **ikke** spise eller drikke den 1. time efter undersøgelsen. Ellers kan man spise og drikke umiddelbart efter undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen fremsendes til din egen læge.

Kirurgisk Klinik • Tranumparken 3A • 2660 Brøndby Strand• tlf.nr.: 3648 6565
www.broendbykirurgi.dk